

- ◆ Ne smijete prestati uzimati lijek Xarelto bez prethodnog savjetovanja sa ljekarom jer se tako može povećati rizik od stvaranja krvnih ugrušaka.
- ◆ Obavijestite svog ljekara ukoliko trenutno uzimate bilo koje druge lijekove, ili ste ih nedavno uzimali ili ih namjeravate početi uzimati, prije nego počnete uzimati lijek Xarelto.
- ◆ Obavijestite ljekara da uzimate lijek Xarelto prije bilo kakve operacije ili invazivnog postupka.

## Kada trebam potražiti savjet ljekara?

Prilikom uzimanja antikoagulacijskih lijekova kao što je lijek Xarelto, važno je biti svjestan mogućih neželjenih efekata. Krvarenje je najčešći neželjeni efekat. Ne započinjite uzimati lijek Xarelto bez prethodnog dogovora sa ljekarom ukoliko znate da ste izloženi riziku od krvarenja. Odmah obavijestite svog ljekara ukoliko imate neki od znakova ili simptoma krvarenja poput sljedećih:

- ◆ bol
- ◆ otjecanje ili nelagodu
- ◆ glavobolju, omaglicu ili slabost

- ◆ neuobičajeno stvaranje modrica, krvarenje iz nosa, krvarenje iz desni, rane kojima treba dugo da prestanu krvartiti
- ◆ menstrualno ili vaginalno krvarenje obilnije nego uobičajeno
- ◆ krv u mokraći koja može biti ružičasta ili smeđa, crvenu ili crnu stolicu
- ◆ iskašljavanje krvi ili povraćanje krvi ili sadržaja nalik talogu crne kafe

## Kako uzimati Xarelto?

- ◆ Kako bi se osigurala optimalna zaštita, lijek Xarelto
  - od 2,5 mg može se uzimati sa hranom ili bez nje

- od 10 mg može se uzimati sa hranom ili bez nje
- od 15 mg se mora uzimati sa hranom
- od 20 mg se mora uzimati sa hranom

**Informacije navedene u ovom materijalu ne zamjenjuju one navedene u uputstvu za pacijenta koje je priloženo svakom pakovanju lijeka Xarelto, lijeka koji sadrži rivaroksaban. Lijekovi koji sadrže rivaroksaban mogu biti na tržištu pod različitim nazivima. Za potpune informacije prije primjene lijeka pročitajte uputstvo za pacijenta (dostupno u svakom pakovanju lijeka Xarelto i na [www.almbih.gov.ba](http://www.almbih.gov.ba)).**

## Kartica sa upozorenjima za pacijenta

**Xarelto® 2,5 mg**



**Xarelto® 10 mg**

**Xarelto® 15 mg**

**Xarelto® 20 mg**

### Bez promotivnog sadržaja

- ◆ Imajte ovu karticu uz sebe u svakom trenutku
- ◆ Pokažite ovu karticu svakom ljekaru ili stomatologu prije liječenja

## Ja sam na antikoagulacijskoj terapiji sa lijekom Xarelto (rivaroksaban)

Ime i prezime:

Drugi lijekovi/stanja:

Adresa:

Datum rođenja:

Tjelesna težina:

## U hitnom slučaju molim obavijestite:

Ime i prezime ljekara:

Broj telefona ljekara:

Faksimil ljekara:

## Molim također obavijestite:

Ime i prezime:

Broj telefona:

Srodstvo:

## Obavijest za ljekare:

- ♦ INR vrijednosti se ne bi smjele koristiti jer nisu pouzdana mjera antikoagulacijske aktivnosti lijeka Xarelto.

## Šta trebam znati o lijeku Xarelto?

- ♦ Xarelto razrjeđuje krv i tako Vas štiti od stvaranja opasnih krvnih ugrušaka.
- ♦ Xarelto morate uzimati tačno prema uputama ljekara. Kako bi osigurali optimalnu zaštitu od stvaranja krvnih ugrušaka, **nikad nemojte propustiti dozu lijeka**.



Bayer